

# Beiträge zur Flechtenflora Brasiliens

VON.

Dr. Alexander ZAHLBRUCKNER.

*Pseudopyrenula diremta* Müll. Arg. in Flora, vol. LXVI. (1883), p. 249 et in Engler, Botan. Jahrbüch, vol. VI (1885), p. 408; Wainio, Etud. Lich. Brésil. vol. II (1890), p. 214. — *Verrucaria diremta* Nyl., Lichgr. Nov. Granat. Prodr. in Acta Societ. Scient. Fennic., vol. VII (1863), p. 492.

Regio Amazonica: Rio Juruá, ad corticem Coussapœ (E. Ule, Expedit. Amazon. Nr. 357).

*Phylloporina epiphylla* (Fée) Müll. Arg.

Prov. Rio de Janeiro, ad folia Bactridis (E. Ule, n° 366 pr. p.)

*Astrothelium conigerum* A. Zahlbr. nov. spec.; typus in herb. Vindob.

Thallus crustaceus, uniformis, epiphloeodes, 0.17 — 0.19 mm. crassus, cartilagineus, effusus, subareolatum-rimosus, lævigatus, sorediis et isidiis destitutus, ochraceo-lutescens vel olivaceo-lutescens, nitidulus, KHO demum rubescens, Ca Cl<sub>2</sub> O<sub>2</sub> —, corticatus, cortice decolore, crasso, ex hyphis ramosis, pachydermaticis, ramosis, conglutinatis formato immixtis cellulis substrati, lutescente, medulla angusta, hyphis non amylaceis, gonidiis chroolepoides, cellulis dilute viridibus.

Stromata sessilia, magna, ad 2 mm. alta et basi ad 1 mm. lata, nigra, a thallo libera, dispersa vel rarius 2 approximata confluentiave, conica vel lageniformi-conica, recta vel leviter obliqua, ad verticem utplurimum retusa et applanata, et poro rotundo tenni, non umbilicato pertusa, collo longuisculo prædita et in parte basali nuclea 2-5 continentia, fuliginea, crassa; peritheciis subglobosis, ostioliis obliquis in ostiolum commune rectum vel subrectum, angustum abeuntibus; hymenio decolore, subgloboso, gelatinoso, guttulis oleosis non impleto, I haud lutescente, ascis vinose-rubentibus; paraphysibus tenuissimis, filiformis, laxe ramosis et connexis, eseptatis; ascis oblongo-vel ellipsoideo-clavatis, ad apicem rotundatis, 210-250  $\mu$ . longis et 48-53  $\mu$ . latis, 8 sporis; sporis in ascis biserialibus, obliquis vel subverticalibus, decoloribus, ellipsoideis vel ovali-ellipsoideis, utrinque rotundatis, membrana crassiuscula cinctis, 3-5 septatis, cellulis subcubico-rotundatis, ultimis minoribus plus minus lentiformibus, rectis vel subrectis, magnis, 70-108  $\mu$ . longis et 26-29  $\mu$ . latis.

Regio Amazonica, Rio Juruá, ad corticem Heveæ brasiliensis (E. Ule, Exped. Amazonic. n° 356).

Eine durch die grossen, konischen, sitzenden und von Lager nicht bekleideten, schwarzen Strömen sehr auffällige Art.

*Heufleria sepulta* Trevis. in Flora, vol. XLIV (1861), p. 23; Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol. II (1890), p. 192. — *Astrothelium sepultum* Montg. in Annal. Scienc. Natur. Botanique, ser. 2<sup>a</sup>, vol. XIX (1843), p. 74.

Regio Amazonica: Rio Juruá, ad corticem Coussapoæ (E. Ule, Expedit. Amazonic. n° 358).

**Opegraphella filicina** Müll. Arg., Lichen. epiphylli novi (1890), p. 20 et in Flora, vol. LXXIII (1890), p. 193. — *Opegrapha filicina* Montg. apud Ramon de la Sagra, Historia fisic. Cuba, Botan. (1838-42), p. 184, Tab. IX, Fig. 1; Müll. Arg. in Flora, vol. LXVI (1883), p. 349; Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol. II (1890), p. 133.

Conceptacula stylosporarum numerosa, minima, semiglobosa, nigra; perithecio fuligineo, dimidiato; stylosporis acicularibus, rectis, subindistincte 6-8 locularibus, 11-13  $\mu$ . longis et ad 0,5  $\mu$ . latis.

Prov. Rio de Janeiro, ad folia Bactridis (E. Ule, n° 366 pr. p.)

**Mazosia strigulina** (Nyl.) A. Zahlbr. in Engler-Prantl, Natürl. Pflanzenfamilien, Teil I, Abt. 1\* (1905), p. 105. — *Chiodecton (Mazosia) strigulina* Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol. II (1890), p. 147 (ubi synonym).

var. **radians** A. Zahlbr. — *Opegrapha (Rotula) radians* Müll. Arg. in Flora, vol. LXVI (1883), p. 348.

Prov. Rio de Janeiro: ad folia Bactridis (E. Ule n° 366 pr. p.)

**Mazosia Rotula** var. **granularis** Müll. Arg. in Bullet. Soc. Botan. Belgique, vol. XXX (1891), p. 77 et in Journ. Linn. Soc. London, Botany, vol. XXIX (1892), p. 328. — *Rotula vulgaris* var. *granularis* Müll. Arg. in Flora, vol. LXXIII (1890), p. 192.

Regio Amazonica: Rio Negro, prope Manáos, ad folia Palmæ cujusdam (E. Ule, Expedit. Amazonic. n° 363).

**Cœnogonium Leprieurii** (Mont.) Nyl.; Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol. II (1890), p. 65.

Regio Amazonica: Rio Juruá, Juruá Miry, corticola, sterilis (E. Ule, Expedit. Amazonica, n° 351).

**Cœnogonium depressum** Müll. Arg. in Flora, vol. LXIV (1881) p. 525.

Regio Amazonica: Rio Negro, prope Manáos, ad folia Araceæ cujusdam, sterilis (E. Ule, Expedit. Amazonic. n° 361).

**Chiodecton sanguineum** (Sw.) Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol. II (1890) p. 143.

Rio Grande do Sol, Neu-Württemberg: prope Elsenau, ca. 500 m. s. m., ad corticem Acaciarum (A. Born müller, n° 5).

**Lopadium leucoxanthum** (Sprgl.) A. Zahlbr. in Sitzungsber. Kais. Akad. Wissensch. Wien, math.-naturwiss. Classe, Band CXI, Abt. I (1902), p. 398. Minas Geraës: Serra do Frasso, corticola (Damazio, n° 1899).

**Cladonia pycnoclada** (Gaudich.) Nyl. f. **exalbescens** Wainio, Monogr. Cladon., vol. I (1887), p. 34 et vol. III (1897), p. 223.

Prov. Rio de Janeiro: Restinga de Maná, sterilis (E. Ule, n° 364); Regio Amazonica: Rio Madeira, sterilis (E. Ule, Expedit. Amazonic. n° 349).

**Cladonia miniata** var. **sanguinea** (Flk.) Wainio, Monogr. Cladon., vol. I (1887), p. 60 et vol. III (1897), p. 224.

São Francisco, ad teram (Noack n° 1).

\*<sup>1)</sup> **Cladonia substellata** Wainio, Monogr. Cladon., vol. I (1887), p. 271 et vol. III (1897), p. 223.

f. **irregularis** Wio. l. c. p. 274.

<sup>1)</sup> Die mit einem Sternchen versehenen *Cladonien* wurden vom Monographen der Gattung, Dr. E. Wainio bestimmt.

Camarinho. ad saxa, fructifera (Damazio n° 1737).

\* f. *divergens* Wainio l. c. p. 274.

Ouro Preto, Morro Cruzeiro, sterilis (Damazio. n° 1772 pr. p.)

\* *Cladonia capitellata* (Tayl.) Babingt.; Wainio, Monogr. Cladon., vol. I (1887) p. 274 et vol. III (1897) p. 283.

Ouro Preto, Morro Cruzeiro, stesilis (Damazio, n° 1772 pr. p.)

*Cladonia peltastica* (Nyl.) Müll. Arg. f. *pallida* Wainio, Monogr. Cladon., vol. I (1887) p. 296 et vol. III (1897) p. 235.

Regio Amazonica: Campino de Ponte Negro prope Manaós, fructifera (E. Ule, Expedit. Amazonic. n° 350).

*Cladonia Carassensis* Wainio, Monogr. Cladon., vol. I (1887) p. 313 et vol. III (1897) p. 237.

Supra saxa ad viam ad Matta do Periquito prope Ouro Preto, optime fructifera (Damazio n° 1729).

\* f. *irregularis* Wainio ll. cc. p. 315 et 237.

Inter Ouro Preto et Mariana (Damazio sine n°).

\* *Cladonia albofuscescens* Wainio, Monogr. Cladon., vol. I (1887) p. 292 et vol III (1897) p. 239.

In summo monte Itaculumi, ad saxa, sterilis (Damazio n° 1757).

*Cladonia ceratophylla* (Sw.) Sprgl.

Rio Grande do Sul, Neu-Württemberg: prope Elsenau, c. 500 m. s. m. sterilis (A. Bornmüller).

\* *Cladonia pityrea* (Flk.) Wainio, Monogr. Cladon. vol. II (1894) p. 349 et vol. III (1897) p. 255.

Ad viam ad Matta do Periquito prope Ouro Preto, ad saxa, fructifera (Damazio n° 1730).

*Cladonia verticillaris* (Raddi) E. Fr., Wainio, Monogr. Cladon., vol. II (1894) p. 203 et vol. III (1897) p. 259.

Prov. São Paulo, Campinas (Noack n° 5).

*Cladonia calycantha* (Del.) Nyl.; Wainio, Monogr. Cladon., vol. II (1894) p. 199 et vol. III (1897) p. 259.

Prov. São Paulo: Campinas, ad terram, fructifera (Noack n° 4.)

*Stereocaulum mixtum* Nyl., Synops. Lich., vol. I (1860) p. 238; Hue, Lich. extra-europ. in Nouv. Archiv. Muséum, ser. 3a, vol. X (1898) p. 246.

Ad saxa in itinere versus Matta do Periquito prope Ouro Preto, fructifera (Damazio n° 1732).

Die vorliegenden Stücke diesen Flechte sind niedrig, bis 26 mm. hoch und dadurch äusserlich vond en Exemplaren der Sandwich-Inseln abweichend. Sie stimmen jedoch in der Grösse des Thallus und in den übrigen Merkmalen vollständig überein mit einem im Herbare des naturhistorischen Hofmuseums in Wien aufbewahrten, von Raddi gesammelten und von Nylander selbst bestimmten Exemplare.

*Leptogium tremelloides* (Linn. f.) Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol. I (1890) p. 224.

Regio Amazonica: Rio Juruá, Juruá Miry, ad ramulos arbosum, fructifera (E. Ule, Expedit. Amazonic. n° 352).

*Leptogium javanicum* Montg., Sylloge Gener. Spec. Cryptog. (1856) p. 379; A. Zahlbr. apud Rechinger in Denkschrift der mathem.-naturwiss. Klasse Kais. Akad. Wissenschaft. Wien, Band LXXXI (1907) p. 254 et 255.

Regio Amazonica, Rio Juruá, Juruá Miry, corticola, fructifera (E. Ule, Expedit. Amazonic. n° 355).

Die podetienähnlichen Lagerteile, auf welchen endständig die Apothecien sitzen, sind im vorliegenden Stücke nicht so scharf gefaltet, als in den javanischen Exemplaren. auch sind die Sporen etwas kleiner ( $20-22 \times 10-11 \mu$ ) und stets nur mit drei wagrechten Scheidenwänden versehen.

**Leptogium phyllocarpum** (Pers.) Nyl.; Wainio, Etud. Lich. Brésil., vol. I (1890) p. 230; Hue, Lich. extra-europ. in Nouv. Archiv. Museum. ser. 3 a, vol. X (1898) p. 228.

Serra do Ouro Preto. Camarinhas, ramulicola (Damazio n° 1728); Rio Grande do Sul, Neu-Württemberg: prope Elsenau, c. 500 m. s. m., ad ramulos Acaciarum (A. Bornmüller n° 6).

**Coccocarpia pellita** var. **smaragdina** (Pers.) Müll. Arg.; Wainio, Etud. Lich. Brésil. vol. I (1890) p. 210.

Minas Geraës: Serra do Frazão, corticola, fructifera (Damazio n° 1898).

**Calenia pulchella** Müll. Arg.!. Lichen. epiphylli novi (1890) p. 4 et in Journ. Linn. Soc. London Botany. vol. XXIX (1892) p. 323.

Excis.: Puiggari, Lich. Brasil. n° 2006, 3005; Spruce, Lichen. Amazonic. n° 544).

Thallus ecorticatus, fere homeomericus, KHO —, Ca Cl<sub>2</sub> O<sub>2</sub> —, hyphis non amylaceis. Perithecio proprio nullo; margine thalino basin versus sensim in thallum abeunte, ecorticato; epithecio nullo; hypothecio lutescente, ex hyphis intricatis formato; hymenio decolore; 26-30  $\mu$  alto, modice gelatinoso, guttulis oleosis destituto, J. lutescente, ascis vinose rubentibus; paraphysibus tenuissimis, flaccidis, ramosis, eseptatis; ascis oblongo-clavatis vel oblongo-ovalibus, ad apices rotundatis et ibidem membrana parum incrassata cinctis, 8 sporis; sporis in ascis biserialibus, plus minus obliquis, uniseptatis, cellula superiore paulum latiore, ad septa haud constrictis, 10-14  $\mu$  longis et 3-4  $\mu$  latis.

Regio Amazonica: Rio Juruá, Juruá Miry, ad folia Sapindaceae cujusdam (E. Ule. Expedit. Amazonica n° 360).

**Lobaria glaberrima** A. Zahlb. — *Sticta glaberrima* D. Notrs. Osserv. Stict. (1852) p. 17; Müll. Arg. in Hedwigia, XXX. (1891) p. 228 et 238. *Ricasolia glaberrima* Nyl., Synops. Lich. vol. I (1860) p. 367; Stzbgr. in Flora, vol. LXXXI (1895) p. 109.

Rio Grande do Sul, Neu-Württemberg: prope Elsenau, c. 500 m. s. m. ad corticem ramorum Acaciarum (A. Bornmüller n° 4).

**Lobaria peltigera** Wainio, Etud. Lich. Brésil., vol. I (1890) p. 199; A. Zahlbr. in Sitzungsber. Kais. Akad. Wissenschaft Wien, math.-natur. Classe, Band CXI, Abt. I. (1902) p. 405. — *Sticta peltigera* Del., Hist. Lich. Sticta (1825) p. 150, Tab. XVIII, Fig. 68.

Minas Geraës: Serra do Caraca, corticola, fructifera (Damazio n° 1905).

**Sticta damæcornis** (Sw.) Ach.; Wainio, Etud. Lich. Brésil., vol. I (1890) p. 191.

Minas Geraës: Serra do Caraca, corticola, fructifera (Damazio n° 1904).

**Sticta aurata** Ach.; A. Zahlbr. in Sitzungsber. Kais. Akad. Wissensch. Wien, math.-naturw. Classe, Band CXI, Abt. I (1902) p. 406.

Serra do Ouro Preto, corticola, sterilis (Damazio n° 1906).

**Sticta clathrata** D. Notrs.; A. Zahlbr. l. s. c. p. 405.

Minas Geraës, prope Cordisburgo, corticola (Damazio n° 1727); São Paulo: Tiété, corticola, fructifera (Gerdes n° 146); Rio Grande do Sul, Neu-Württemberg, prope Elsenau, c. 500 m. s. m., ad Acacias (A. Bornmüller n° 4).

**Peltigera polydactyla** Hoffm.

Ouro Preto, Alto do Itaculumi, ad terram (Damazio n° 951).

**Parmelia microsticta** Müll. Arg. in Flora, vol. LXII (1879) p. 164 et in Hedwigia, vol. XXX (1891) p. 229 et vol. XXXIV (1894) p. 39; Wainio in Mémoir. Herb. Boissier, n° 5 (1900) p. 4.

Pycnoconidia filiformi-cylindrica, recta, subrecta vel levissime curvata, utrinque retusa, 16-20  $\mu$  longa et vix 1  $\mu$  lata.

Rio Grande do Sul, Neu-Württemberg; prope Elsenau, c. 500 m. s. m. ad ramos Acaciarum, fructifera (A. Bornmüller).

**Parmelia melanothrix** Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol. I (1890) p. 30; Hue, Lich. extra-europ. in Nouv. Archiv. Muséum, ser. 4a, vol. I (1899) p. 198; A. Zahlbr. in Sitzungsber. Kais. Akad. Wissensch. Wien, math.-naturw. Classe, Band CXI, Abt. I (1902) p. 425. — *Cetraria melanothrix* Montg., Sylloge Cryptog. (1856), p. 324.

Rio Grande do Sul, Neu-Württemberg: prope Elsenau, c. 500 m. s. m. ad ramos Acaciarum (A. Bornmüller).

**Parmelia subrugata** Krphbr. in Verhandl. zool.-botan. Gesellsch. Wien, vol. XVIII (1868) p. 320; Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol. I (1890) p. 203; A. Zahlbr. in Sitzungsher. Kais. Akad. Wissensch. Wien, math.-naturw., Classe, Band CXI, Abt. I (1902) p. 427.

Rio Grande do Sul, Neu-Württemberg: prope Elsenau, c. 500 m. s. m. ad ramulos Acaciarum (A. Bornmüller).

**Parmelia tinctorum** Despr.

São Paulo: Tiété, ad arbores in silvis, sterilis (Gerdes n° 148).

**Parmelia abnuens** Nyl. in Flora, vol. LXVIII (1885) p. 610.

Rio Grande do Sul, Neu-Württemberg: prope Elsenau, c. 500 m. s. m. ad Acacias (A. Bornmüller).

**Parmelia proboscidea** Tayl. in Mack., Flora Hibern., vol. II (1836) p. 143; Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol. I (1890) p. 29; Hue, Lich. extra-europ. in Nouv. Archiv. Muséum, ser. 4a, vol. I (1899) p. 196.

Camarinhas, ad arbores, fructifera (Damazio n° 1762).

var. **sorediifera** Müll. Arg. in Flora, vol. LXVII (1884) p. 615; Hue l. s. c. p. 197.

Cocheiro do Campo, corticola, sterilis (Damazio n° 1736).

**Parmelia urceolata** Eschw., Icon. Select. (1827) p. 23, Tab. XIII, Fig. 1; Müll. Arg. in Hedwigia, vol. XXX (1891) p. 228.

Rio Grande de Sul, Neu-Württemberg: prope Elsenau, c. 500 m. s. m., corticola, fructifera (A. Bornmüller).

**Parmelia perlata** Krph.; Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol. I (1890) p. 28; Hue, Lich. extra-europ. in Nouv. Archiv. Muséum, ser. 4a, vol. I (1899) p. 194.

Minas Geraës: Serra do Caraça, corticola, sterilis (Damazio n° 1902), Serra do Ouro Preto, corticola, sterilis (Damazio n° 1907).

**Parmelia pluriformis** Nyl., Synops. Lich., vol. I (1860) p. 381 et in Flora, vol. LII (1869) p. 117; Krphbr. in Flora, vol. LIX (1876) p. 72; Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol. I (1890) p. 45; Hue, Lich. extra-europ. in Nouv. Archiv. Muséum, ser. 4a, vol. I (1899) p. 170; A. Zahlbr. in Sitzungsber. Kais. Akad. Wissensch. Wien, math.-naturw. Classe, Band CXI, Abt. I (1902) p. 424.

Prope Trino, ad arbores, fructifera (Damazio n° 1739), Morro do S. Sebastião, ramicola, apotheciis juvenilibus (Damazio n° 1792).

Die Stücke aus der Umgebung von Trino unterscheiden sich von den

von Puiggari unter n° 403 ausgegebenen Exemplaren etwas dadurch, dass der Fruchtrand fast ganzrandig und nur schwach gekerbt ist.

*Parmelia cetrata* Ach., Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol. I (1890) p. 40; Hue, Lich. extra-europ. in Nouv. Archiv. Muséum, ser. 4a, vol. I (1899) p. 173.

Minas Geraës: Serra do Caraça, corticola, fructifera (Damazio n° 1903); Rio Grande do Sul, Neu-Württemberg: prope Elsenau, c. 500 m. s. m. (A. Bornmüller).

var. *corniculata* (Krpflhr.) Müll. Arg. in Jahresber. Kgl. Botan. Gart. Berlin, vol. II (1883) p. 312; Hue, Lich. extra-europ. in Nouv. Archiv. Muséum, ser. 4a, vol. I (1899) p. 176, Tab. V, Fig. 4.

Prope Cordisburgo, ad arbores, sterilis (Damazio n° 1769).

*Parmelia amazonica* Nyl in Flora, vol. LXVIII (1885) p. 611; Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol. I (1890) p. 47.

Prope Cochœira do Campo, corticola, fructifera (Damazio n° 1767).

Die von Damazio gesammelten Stücke stimmen mit dem *Nylanderschen* Original, *Spruce*, Lich. Amazonici n° 111, vollständig überein. Bezüglich der chemischen Reaktion ist die Angabe *Nylanders* insoferne abzuändern, als sich die Markschiechte mit Kalilauge zuerst gelb, endlich blutrot färbt, ebenso wird sie durch  $\text{KHO} + \text{Ca Cl}_2 \text{ O}_2$  endlich auch rot gefärbt. Die Sporen fand ich 21-24  $\mu$  lang und 10 — 12  $\mu$  breit.

*Parmelia minarum* Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol. I (1890) p. 48 et in Journal of Botany, vol. XXXIV (1896) p. 33; Hue, Lich. extra-europ. in Nouv. Archives Muséum, ser. 4a, vol. I (1899) p. 153.

Serra do Ouro Preto, Camarinhas, ad ramos ramulosque arborum (Damazio n° 1456).

*Parmelia* (sect. *Hypotrachyna*) *amoena* A. Zahlbr. nov. sp.; typus in herb. Vindob.

Thallus substrato adpressus, conspicuus, usque 14 cm. latus, rigidiusculus, superne osseo-albidus vel cinerascens-albidus, nitidus, KHO flavus,  $\text{Ca Cl}_2 \text{ O}_2$  —, inferne niger, rhizinis densissimis, sat brevibus obsitus, in margine anguste castaneo, nitido et rhizinis sparsis munito, in ipso margine eciliatus, laciniatus, laciniis usque 14 mm. latis, profunde inciso-lobatis, sinubus rotundatis, lobis plus minus conniventibus, inciso-lacinulatis vel inciso-crenulatis, laciniis in margine rotundatis vel rarius anguloso-rotundatis, sorediis destitutus, epunctatus, lævigatus, in centro isidiosus, isidiis brevissimis, cylindricis, increbris, ochraceo-cinerascensibus, utrinque corticatus, cortice superiore continuo, pallido, 18-23  $\mu$  crasso, cortice inferiore nigro, 18-20  $\mu$  crasso; medulla alba, KHO —,  $\text{Ca Cl}_2 \text{ O}_2$  —, KHO +  $\text{Ca Cl}_2 \text{ O}_2$  —, ex hyphis circ. 2  $\mu$  crassis, dense contextis formata; gonidiis pleurococcoideis, globosis, 8-11  $\mu$  latis, infra corticem superiorem stratum angustum, plus minus continuum formantibus.

Apothecia 6—8 mm. lata, brevissime pedicellata, vesiculoso-cupuliformia, imperforata; disco lævi, nudo, testaceo vel testaceo-fuscescente, nitido; receptaculo thallo concolore, primum lævigato et nudo, demum isidiosulo et ruguloso-reticulato; margine thallico bene incurvo, lacerulato-fimbriato; excipulo strato medullari gonidia infra hymenium et infra stratum corticole continente; hypothecio decolore, 60-80  $\mu$  crasso, in parte inferiore ex hyphis perpendicularibus, ramosis, dense contextis formato; hymenio augusto, 35-40  $\mu$  alto, in parte superiore rufescente, cæterum decolore, strato amorpho tenui tecto, I cæruleo; paraphysibus strictiusculis, dense contextis, ad 3  $\mu$  crassis, subsimplicibus, ad apicem parum

crassioribus; ascis hymenio brevioribus, oblongis, ad apicem rotundatis et ibidem membrana incrassata cinctis, 8 sporis; sporis decoloribus, simplicibus, ovali-ellipsoideis vel ovalibus, membrana tenui cinctis, 8-10  $\mu$  longis et 5 — 5,5  $\mu$  latis.

Conceptacula pycnoconidiorum punctiformia, nigra, subemersa; perithecio nigro, dimidiato; fulcris endobasidialibus, parmelioides; pycnoconidiis cylindrico-subbifusiformibus, rectis, ad apices rotundatis, 3-5  $\mu$  longis et ad 0,5  $\mu$  latis.

Serra do Ouro Preto, Camarinhas, ad saxa (Damazio n° 1453) et Morro do S. Sebastião, saxicola (Damazio n° 1756).

Die durch das helle, glänzende und grosslappige Lager auffallende Art gehört in die Gruppe der *Cylocheila*. Sie dürfte, nach der Beschreibung zu schliessen, der *Parmelia tropica* Wainio nahe stehen, kann jedoch mit dieser wegen der Farbe der Thallus und der grosser Lappen desselben nicht vereinigt werden.

**Parmelia** (sect. **Hypotrachyna**) **brachyconidia** A. Zahlbr. nov. sp.; typus in herb. Vindob.

Thallus usque 5 cm. latus, adpressus, membranaceus, superne albidus vel glaucescenti-albidus, nitidulus, KHO flavens, Ca Cl<sub>2</sub> O<sub>2</sub> —, subtus niger, opacus, increbre rhizinosus, rhizinis versus ambitum thalli rarioribus, papillosis, in margine ipso tamen rhizinis brevibus, ut plurimum simplicibus obsitis, irregulariter divisus, laciniis inaequaliter dilatatis, contiguis vel subimbricatis, 2-3 mm. latis, planiusculis, laevigatis, sinuato-lobatis, lobis e sinibus rotundatis, convergentibus, sinuato-crenatis vel incisus, crenis subangulosus, isidiis et sorediis destitutus, utrinque corticatus, cortice superiore pallido, angusto, 18—20  $\mu$  crasso, cortice inferiore nigro, 35—40  $\mu$  crasso; medulla alba, ex hyphis circ. 3  $\mu$  crassis, ramosis, dense intricatis formata, Ca Cl<sub>2</sub> O<sub>2</sub> et KHO + Ca Cl<sub>2</sub> O<sub>2</sub> haud erythrina; gonidiis infra stratum corticale superius zonam continuam, sat crassam formantibus, globosis, 7—10  $\mu$  latis.

Apothecia brevissime pedicellata, cupuliformia, usque 5 mm. lata, imperforata; disco rufescenti-fusco, nitidulo, nudo; receptaculo thallo concolore, isidiis et sorediis destituto, minute verruculoso; margine thallino diu inflexo, crenulato; excipulo strato medullari sat crasso gonidia infra stratum corticale et infra hypothecium includente; hymenio decolore, in parte superiore rufescente, 60—70  $\mu$  alto, J coeruleo, imprimis ascis; hypothecio duplici, in parte inferiore ex hyphis plus minus longitudinalibus, in parte inferiore ex hyphis subverticalibus, ramosis et subreticulatis formato; paraphysisbus densis, gelatinam increbram percurrentibus, simplicibus vel parce ramosis, eseptatis, ad apices haud latioribus; ascis ellipsoideis vel oblongo ellipsoideis, hymenio parum brevioribus, membrana in apice rotundato incrassata cinctis, 8 sporis; sporis in ascis subbiserialibus, subverticalibus, decoloribus, simplicibus, ovalibus, oblongo ovalibus vel ellipsoideis, tenuiter limbatis, 12—16  $\mu$  longis et 8—9  $\mu$  latis.

Conceptacula pycnoconidiorum immersa, nigra, punctiformia, globosa; perithecio nigrescente, dimidiato; fulcris parmelioides; pycnoconidiis cylindricis, in medio levissime constrictis, rectis, apicibus rotundatis, 3,5 — 5,5  $\mu$  longis et ad 0,5  $\mu$  latis.

Serra do Ouro Preto, Vellozo, corticola, fructifera (Damazio n° 1744, 1765).

var. **chlorocarpa** A. Zahlbr. nov. var.

Discus apotheciorum pallide testaceus.

Cachoeira do Campo, ad ramos arborum, fructifera (Damazio no 1740).

Die neue Art gleicht habituell eine kleinen *Parmelia tiliacea*, weicht von dieser jedoch durch die grösseren Sporen und durch die kurzen, in der Mitte eingeschnürten Pyknokonidien wesentlich ab.

**Parmelia brasiliiana** Nyl. ! in Flora, vol. LXVIII (1885) p. 611; Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol. I (1890) p. 50; Hue, Lich. extra-europ. in Nouv. Archives Muséum, ser. 4a, vol. I (1899) p. 145.

Camarinhas, ad saxa, fructifera (Damazio n. 1760 pr. p.); Morro do Cruzeiro. Ouro Preto, ad saxa, sterilis (Damazio n. 1318).

**Parmelia bahiana** Nyl. ! in Flora, vol. LXVIII (1885), p. 612.

Camarinhas, ad saxa, fructifera (Damazio n. 1759).

**Parmelia** (sect. **Xanthoparmelia**) **erythrocardia** A. Zahlbr. nov. spec.; typus in herb. Vindob.

Thallus substrato adpressus, tenuis, membranaceus, fragilis, pallide stramineus. nitidulus, madefactus persicino-glaucescens KH<sub>0</sub> flavens, Ca Cl<sub>2</sub> O<sub>2</sub> —, isidiis et soreidiis destitutus, lævigatus, pilis nigris, minutis, circ. 0,5 mm. longis, simplicibus vel subfasciculatis ornatus, inferne niger, nitidulus, versus ambitum rhizinis nigris, plus minus ramosis vel simplicibus, circ. 1 mm. longis, haud densis obsitus, cæterum papillosus, iteratim dichotome vel rarius trichotome laciniatus, laciniis primariis usque 7 mm. longis, convexiusculis vel planis, 1,5-2,3 mm. latis, laciniis laterilibus totidem latis vel paulum angustioribus, linearibus, semipatentibus, in margine integris vel subintegris, ad apicem triangularibus acutatisque emarginatis vel retusis. utrinque corticatus, cortice superiore continuo, pallido, tenui, cortice inferiere nigro; gonidiis infra corticem superiorem stratum continuum formantibus, globosis, 7-9  $\mu$  latis; medulla in partibus marginalibus alba, madefacta rosaceo, KH<sub>0</sub> et flavo sanguinea, Ca Cl<sub>2</sub> O<sub>2</sub> —. in parte centrali thalli crocea vel croceo-sanguinea ex hyphis 2-3  $\mu$  crassis, leptodermaticis intricatisque formata.

Apothecia ignota.

Conceptacula pycnoconidiorum immersa, punctiformia, nigra; pycnokonidiis evolutis non visis.

Camarinhas, ad saxa muscosa (Damazio n. 1761).

Die neue Art weicht von den übrigen *Xanthoparmelien* durch die blutrote Markschiote und durch die auf der Oberseite der Lagers zur Ausbildung gelangenden kurzen, schwarzen, oft hackenförmig gekrümmten Haargebilden ab. Habituell gleicht sie der *Parmelia flava* Krphr.

**Ramalina geniculata** Nyl., Cogn. Ramal. (1870), p. 65; Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol. I (1890) p. 15; Hue, Lich. extra-europ. in Nouv. Archives Muséum, ser. 4a, vol. I (1899) p. 79, Tab. IV, Fig. 6.

Prope Cachoeira do Campo, ad arbores fructifera (Damazio n. 1768).

**Ramalina Puiggarii** Müll. Arg ! in Flora, vol. LXIV (1881), p. 83; Wainio in Mémoir. Herb. Boissier, n. 5 (1900), p. 2.

Morro do S. Sebastião, ad arbores, fructifera (Damazio, n. 1734 pr. p.).

**Ramalina complanata** Ach.; Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol. I (1890) p. 21; Hue, Lich. extra-europ. in Nouvell. Archives Muséum, ser. 4a, vol. I (1899), p. 67.

Ouro Preto, corticola, fructifera (Damazio n. 1733).

**Ramalina Yemensis** Nyl.; Hue, Lich. extra-europ. in Nouv. Archives Muséum, ser. 4a, vol. I (1899) p. 74.

São Paulo : Tiélé, corticola, fructifera [Gerdés, n. 149].

Rio Grande do Sul, Neu-Württemberg : prope Elsenau, c. 500 m. s. m., ad ramulos Acaciarum, fructifera (A. Bornmüller).

**Ramalina lanceolata** Nyl., *Recogn. Romal.* (1870), p. 47; Hue, *Lich. extra-europ.* in *Nouv. Archives Muséum*, ser. 4a, vol. I. (1899), p. 75, Tab. IV, Fig. 4.

Sta Catharina : Blumenau, fructifera (Haerschen, n. 151).

**Usnea florida** var. **comosa** Wainio, *Etud. Lich. Brésil*, vol. I. (1890) p. 3; Hue, *Lich. extra-europ.* in *Nouv. Archives Muséum*, ser. 4a, vol. I (1899), p. 36. — *Lichen comosus* Ach. in *Kgl. Vet. Akad. Handl.* (1795) p. 209, Tab. VIII, Fig. 1.

Rio Grande do Sul, Neu-Württemberg : prope Elsenau, c. 500 m. s. m. ad Acacias (A. Bornmüller).

Var. **perplexans** Wainio, *Etud. Lich. Brésil*, vol. I (1890), p. 3; Hue, l. s. c. p. 36. — *Usnea perplexans* Strtu. in *Scottish Naturalist*, vol. VI (1882) p. 103.

São Paulo : Campinas, corticola fructifera (Noack n. 3).

Rio Grande do Sul, Neu-Württemberg : prope Elsenau, c. 500 m. s. m., corticola, fructifera (A. Bornmüller).

Var. **strigosa** Ach., *Method. Lich.* (1803), p. 310, Tab. VI, Fig. 3; Hue, l. s. c. p. 34.

Rio Grande do Sul, Neu-Württemberg, prope Elsenau, c. 500 m. s. m., ad Acacias (A. Bornmüller).

**Usnea mollis** var. **subelegans** A. Zahlbr. — *Usnea barbata* \* *U. florida* var. *subelegans* Wainio, *Etud. Lich. Brésil*, vol. I (1890), p. 6; Hue, *Lich. extra-europ.* in *Nouv. Archives Muséum*, ser. 4a, vol. I (1899), p. 36.

Rio Grande do Sul, Neu-Württemberg; prope Elsenau, c. 500 m. s. m., corticola (A. Bornmüller).

Unterscheidet sich von dem Typus durch ein weicheres, längeres, fast hängendes Lager, ferner dadurch, dass die älteren Thallusabschnitte Querrisse aufweisen und endlich durch die Reaktion der Markschichte durch Kalilauge.

**Usnea dasypoga** f. **dasypogoides** (Nyl.) Hue, *Lich. extra-europ.* in *Nouvell. Archives Muséum*, ser. 4a, vol. I (1899), p. 47.

Serra do Ouro Preto, Morro de S. Sebastião, corticola, sterilis. (Damazio sine no.).

Var. **plicata** f. **sorediata** A. Zahlbr. nov. f. — *Usnea arthroclada* A. Zahlbr. in *Bullet. Herb. Boissier*, ser. 2a, vol. V (1905), p. 543 non Fée.

Thallus cinerascenti-viridescens, ramis primariis 1-1,2 mm. crassis, teretibus, crebre albo-annulatis, increbre dichotome vel sympodialiter divisus, ramis patentibus, fibrillis fere nullis, sorediosus, sorediis primum punctiformibus, albidis, parum prominulis et plus minus confluentibus, demum fere semiglobosis, 1-1,4 mm. latis, glaucescentibus et pulverulentis. Medulla KHO e flavo rubens,  $\frac{2}{3}$  latitudinis thalli occupans. Apothecia non visa.

Serra do Ouro Preto, Morro do S. Sebastião, corticola (Damazio, n. 1271).

**Usnea strigosella** Stnr! in *Bullet. Herb. Boissier*, ser. 2a, vol. VII (1907) p. 637.

Var. **furfurosula** A. Zahlbr. nov. var.

Ramis (exceptis ultimis) plus minus furfuraceis vel subpulverulentis.

Cæterum cum typo quadrat. Thallus pendulus, usque 15 cm. longus, mollis.

Prope Trino, ad arbores, sterilis (Damazio n. 1771).

*Usnea angulata* Ach., Synops. Lich. (1814), p. 307; Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol. I (1890) p. 41; Hue, Lich. extra-europ. in Nouv. Archives Muséum, ser. 4a, vol. I (1899), p. 44.

Rio Grande do Sul, Neu-Württemberg : prope Elsenau, c. 500 m. s. m., sterilis (A. Bornmüller n. 7).

*Theloschistes flavicans* f. *hirtella* Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol I (1890), p. 114.

Cachœira do Campo, ad ramos arborum in sylvis, fructifera (Damazio n. 1735) : Saõ Paulo : prope Tiété, ad ramulos, sterilis (Gerdes n. 147); Rio Grande do Sul, Neu-Württemberg; prope Elsenau, c. 500 m, s. m., sterilis (A. Bornmüller n. 3 pr. p.)

*Theloschistes exilis* (Michx) Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol. I (1890) p. 115.

Rio Grande do Sul, Neu-Württemberg : prope Elsenau, c. 500 m. s. m., fructifera (A. Bornmüller n. 3 pr. p.).

*Physcia integrata* var. *sorediosa* Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol. I (1890) p. 142; Hue, Lich. extra-europ. in Nouvell. Archives Muséum, ser. 4a, vol. II (1900) p. 63, Tab. IV, Fig. 3.

Serra do Ouro Preto, Vellozo, corticola, fructifera (Damazio n. 1764).

*Anaptychia leucomelæna* (L.) Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol. I (1890) p. 128.

Rio Grande do Sul, Neu-Württemberg prope Elsenau, c. 500 m. s. m., corticola (A. Bornmüller n. 2).

*Anaptychia hypoleuca* (Mühlbg.) Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol I. (1890), p. 133.

Cachœira do Campo, corticola, fructifera (Damazio n. 1763); Saõ Paulo, Tiété, corticola, sterilis (Gerdes n. 150); Rio Grande do Sul, Neu-Württemberg, prope Elsenau, c. 500 m. s. m., corticola (A. Bornmüller).

*Anaptychia comosa* (Eschw.). Trevis.; Wainio, Etud. Lich. Brésil, vol. I (1890), p. 131.

Serra do Ouro Preto : Vellozo, ad ramos arborum, fructifera (Damazio sine no.); Rio Grande do Sul, Neu-Württemberg : prope Elsenau, c. 500 m. s. m., sterilis (A. Bornmüller).